

téléimprimés



EDITION GRANDES CULTURES

STATION POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 236 (09/93) du 07 Avril 1993

COLZA : Période favorable aux contaminations de sclérotinia les 5, 6 et 7 Avril

COLZA

Stade : F1 à G1 (Début floraison à 10 premières siliques ayant une longueur inférieure à 2 cm).

SCLEROTINIA

Situation

Une période d'humidité favorable aux contaminations de sclérotinia (40 heures d'hygrométrie supérieure à 85 %) a été enregistrée les 5, 6 et 7 Avril sur l'ensemble de la région. La longueur de la période a variée de 55 à 60 heures suivant les postes.

Préconisation

Traitement indispensable sur les parcelles, au potentiel jugé suffisant et qui n'ont pas eu d'application préventive. Pour le choix de votre produit, reportez-vous au tableau accompagnant le bulletin n° 232 du 16 Mars 1993.

IMPORTANT : Si vous réalisez votre protection après le 8 Avril, il faudra absolument avoir recours à un des 3 produits à la curativité suffisante (7 jours) soit Sumisclex, Ronilan ou Konker.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

